

# Gør mere for dine lipidpatienter

## Familiær Hyperkolesterolæmi (FH)

### Opsporing

**LDL-C > 5 mmol/l** (ubehandlet)<sup>1)</sup>

**OBS!** Mistænk FH og **HENVIS** til familieudredning af hensyn til børn og nærmeste familie

## Manifest kardiovaskulær sygdom og/eller diabetes med ≥ 1 risikofaktor og/eller organpåvirkning

### Opfølgning

**LDL-C > 1,8 mmol/l**<sup>2)</sup>

**OBS!** Vær opmærksom på compliance / statinintolerans

### Medicinsk behandling af LDL-C<sup>1,2)</sup>

Atorvastatin 80 mg  
eller højst tolereret dosis af statin  
+/- ezetimibe

(PCSK9-hæmmer kan udskrives af specialist, hvis gældende kriterier er opfyldt)

### Behandlingsmål for LDL-C<sup>1,2)</sup>

**LDL-C < 2,5 mmol/l** (FH primær profylakse)

**LDL-C < 1,8 mmol/l** (sekundær profylakse)

### Hvis LDL-C behandlingsmålet ikke nås

**OBS!** Vær opmærksom på høj udgangs LDL-C værdi (FH?), compliance og/eller statinintolerans

### 1) Prøv et andet statin (2-3 statiner forsøges)<sup>2)</sup>

2) Forsøg pausering og dosisreduktion

3) Forsøg med lav dosis statin med lang halveringstid\* 1-3 x ugentligt

Spørgsmål og henvisning til Lipidambulatorium eller Lipidklinik

\* atorvastatin, rosuvastatin

1) Dansk Cardiologisk Selskabs holdningspapir om Familiær Hyperkolesterolæmi (FH) 2012

2) Dansk Cardiologisk Selskab. National behandlingvejledning kap 28: